



МАКСИКОЛД® для детей

ИМЕНОТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



otc Pharm
ОТИСИФАРМ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ И ВИДЫ БОЛИ У ДЕТЕЙ



ШКАЛА МИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ БОЛИ У ДЕТЕЙ



| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| счастлив, доволен, боли нет | слегка болит | умеренно болит | существенно болит | сильно болит | невыносимо болит |

МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ

ВЫГОДНЫЙ ОБЪЕМ: 200 г



с 3-х мес. до 12 лет

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ



обезболивающее



жаропонижающее



противовоспалительное

МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ: режим дозирования

| возраст ребенка | масса тела | разовая доза суспензии | кратность в сутки | МАХ доза суспензии |
|-----------------|------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 3-6 месяцев | более 5 кг | 2.5 мл | 3 раза | 7.5 мл в сутки |
| 6-12 месяцев | 6-10 кг | 2.5 мл | 3-4 раза | 10 мл в сутки |
| 1-3 года | 10-15 кг | 5.0 мл | 3 раза | 15 мл в сутки |
| 4-6 лет | 15-20 кг | 7.5 мл | 3 раза | 22.5 мл в сутки |
| 7-9 лет | 21-29 кг | 10 мл | 3 раза | 30 мл в сутки |
| 10-12 лет | 30-40 кг | 15 мл | 3 раза | 45 мл в сутки |