

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАКСИКОЛД®
для детей

otc Pharm
ОТИСИФАРМ



КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕБЕНКА от 0 месяцев до 6 лет¹

Инфекция	Гепатит В	Туберкулез	Пневмококковая инфекция	Дифтерия, коклюш, столбняк	Гемофильная палочка	Полиомиелит	Корь, краснуха, эпидемический паротит	Грипп	
В роддоме	Первые 24 часа жизни	Первая							
	3-7 день жизни		Первая						
В прививочном кабинете	1 месяц	Вторая							
	2 месяца	Третья*		Первая					
	3 месяца			Первая	Первая*	Первая			
	4,5 месяца			Вторая	Вторая*	Вторая			
	6 месяцев	Третья		Третья	Третья*	Третья		Первая*	
	7 месяцев								
	8 месяцев								
	12 месяцев	Четвертая*					Первая		
	15 месяцев			Третья					
	18 месяцев				Четвертая	Четвертая*	Четвертая		
	20 месяцев						Пятая		Ежегодно
	26 месяцев								
6 лет		Вторая					Вторая		

*для детей группы риска

МАКСИКОЛД®
для детей

от жара, боли у детей с 3-х месяцев

1. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. N 125н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ»





ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ:

- Прививку нельзя проводить, если ребенок болен или простыл
- Вакцинация возможна через 1 месяц после полного выздоровления малыша с одобрения лечащего врача
- Неделю до вакцинации и 2 недели после вакцинации не рекомендуется вводить ребенку в рацион новые продукты питания
- После прививки через 6–8 часов может повышаться температура и держаться повышенной до 2–х суток
- Не стоит отлучать ребенка от грудного вскармливания в период проведения прививок
- Вечером в день вакцинации не рекомендуется купать малыша
- Желательно воздержаться от посещения общественных мест с малышом за 2–3 дня до и неделю после проведения вакцинации
- Родители имеют право отказаться от вакцинации ребенка, но при этом они должны понимать, что несут ответственность за здоровье своего ребенка
- Данные о выполненной прививке должны быть внесены в амбулаторную карту ребенка

МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ: при жаре, боли и воспалении

ДЕЙСТВУЕТ

БЫСТРО^{1,2}



ДЛИТЕЛЬНО^{1,2}



С 3-Х МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ

1. Ушкалова, Е.А. Профиль безопасности анальгетиков– антипиретиков в педиатрии / Русский медицинский журнал. –2014.– Т. 22. –№ 21.– С. 1526–1529.
2. Морозова Т.Е., Рыкова С.М., Юдина И.Ю. Ибупрофен у детей: профиль эффективности и безопасности: «Практика педиатра», сентябрь 2014, с. 18–22

*для действующего вещества ибупрофен

МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ: режим дозирования

возраст ребенка	масса тела	разовая доза суспензии	кратность в сутки	МАХ доза суспензии
3-6 месяцев	более 5 кг	2.5 мл	3 раза	7.5 мл в сутки
6-12 месяцев	6-10 кг	2.5 мл	3-4 раза	10 мл в сутки
1-3 года	10-15 кг	5.0 мл	3 раза	15 мл в сутки
4-6 лет	15-20 кг	7.5 мл	3 раза	22.5 мл в сутки
7-9 лет	21-29 кг	10 мл	3 раза	30 мл в сутки
10-12 лет	30-40 кг	15 мл	3 раза	45 мл в сутки

РУ ЛП-003228

www.otcpharm.ru

www.maxicold.ru

ИМЕНЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ