

МАКСИКОЛД® для детей

ИМЕНОТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

otc Pharm
ОТИСИФАРМ



МАКСИКОЛД[®] для детей

УЧЕТНЫЙ ЛИСТ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕБЕНКА И РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ МАКСИКОЛД[®] для ДЕТЕЙ

ФИО: _____

ВОЗРАСТ: _____

ВЕС: _____



прием в качестве жаропонижающего средства не более 3-х дней, при необходимости более длительного приема или в случае неэффективности, требуется дополнительная повторная консультация врача

дата	время	температура	доза МАКСИКОЛД для ДЕТЕЙ					заметки
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	
			<input type="checkbox"/> 2.5 мл	<input type="checkbox"/> 5.0 мл	<input type="checkbox"/> 7.5 мл	<input type="checkbox"/> 10 мл	<input type="checkbox"/> 15 мл	

**Обязательно звоните врачу
в случае, если:**



- ребенок младше 12 месяцев и жар не спадает в течение суток
- температура тела выше 38.5°C, несмотря на принятие жаропонижающего средства
- жар не спадает в течение двух дней у детей старше 1 года

МАКСИКОЛД[®] для детей

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ У ДЕТЕЙ?

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ У ДЕТЕЙ:



в подмышечной
впадине



в прямой кишке
(выше на 0.6–1.2°C)




в ротовой полости
(выше на 0.3–0.6°C)



в наружном слуховом проходе
(выше на 0.6–1.2°C)

УРОВНИ И ГРАНИЦЫ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ:



от 35.1 до 37°C

нормальная

от 37 до 38°C

повышенная
(субфебрильная)

от 38.1 до 39°C

умеренная
(фебрильная)

выше 39.1°C

высокая

выше 41.0°C

гипертермическая

ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ ПО ВОЗРАСТАМ:

возраст	значение
новорожденные	38.8°C
6 месяцев	37.7°C
1 год	37.7°C
3 года	37.7°C
6 лет	37.0°C
взрослые	37.0°C

ВЫГОДНЫЙ ОБЪЕМ: 200 г



ДЕЙСТВУЕТ:

1,2
БЫСТРО



С 15 МИН.

1,2
ДЛИТЕЛЬНО



ДО 8 Ч.

1. Ушкалова, Е.А. Профиль безопасности анальгетиков– антипиретиков в педиатрии / Русский медицинский журнал. –2014.– Т. 22. –№ 21.– С. 1526–1529.
2. Морозова Т.Е., Рыкова С.М., Юдина И.Ю. Ибупрофен у детей: профиль эффективности и безопасности: «Практика педиатра», сентябрь 2014, с. 18–22

*для действующего вещества ибупрофен

возраст ребенка	масса тела	разовая доза суспензии	кратность в сутки	МАХ доза суспензии
3-6 месяцев	более 5 кг	2.5 мл	3 раза	7.5 мл в сутки
6-12 месяцев	6-10 кг	2.5 мл	3-4 раза	10 мл в сутки
1-3 года	10-15 кг	5.0 мл	3 раза	15 мл в сутки
4-6 лет	15-20 кг	7.5 мл	3 раза	22.5 мл в сутки
7-9 лет	21-29 кг	10 мл	3 раза	30 мл в сутки
10-12 лет	30-40 кг	15 мл	3 раза	45 мл в сутки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАКСИКОЛД®
для детей

МАКСИКОЛД®
для детей