

МАКСИКОЛД® для детей

ИМЕНОТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПРОСТУДЫ У ДЕТЕЙ



ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ: при жаре, боли и воспалении

БЫСТРО^{1,2}



ДЕЙСТВУЕТ



ДЛИТЕЛЬНО^{1,2}



С 3-Х МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ

1. Ушкалова, Е.А. Профиль безопасности анальгетиков– антипиретиков в педиатрии / Русский медицинский журнал. –2014.– Т. 22. –№ 21.– С. 1526–1529.
2. Морозова Т.Е., Рыкова С.М., Юдина И.Ю. Ибупрофен у детей: профиль эффективности и безопасности: «Практика педиатра», сентябрь 2014, с. 18–22

*для действующего вещества ибупрофен

МАКСИКОЛД® для ДЕТЕЙ: режим дозирования

возраст ребенка	масса тела	разовая доза суспензии	кратность в сутки	МАХ доза суспензии
3-6 месяцев	более 5 кг	2.5 мл	3 раза	7.5 мл в сутки
6-12 месяцев	6-10 кг	2.5 мл	3-4 раза	10 мл в сутки
1-3 года	10-15 кг	5.0 мл	3 раза	15 мл в сутки
4-6 лет	15-20 кг	7.5 мл	3 раза	22.5 мл в сутки
7-9 лет	21-29 кг	10 мл	3 раза	30 мл в сутки
10-12 лет	30-40 кг	15 мл	3 раза	45 мл в сутки

РУ ЛП-003228

www.otcpharm.ru

www.maxicold.ru

ИМЕНЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ